

Doxaben 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Doxaben XL 可迅 持續錠	Doxazosin XL	4 mg/tab
Doxaben 可迅錠	Doxazosin	2 mg/tab

【作用】

治療高血壓、良性前列腺肥大

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 每日使用一次，於早晨或晚間使用，請於固定時間服用。
3. 使用持續釋放劑型，於早餐一併服用；注意需整粒吞服，不可咀嚼、剝半或敲碎。(藥殼會隨糞便排出)

【注意事項】

- 1、此藥用於控制病症但無法治癒，療效在療程開始幾星期後見效，病情好轉請持續服藥不可私自停藥或增減藥量。
- 2、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您曾患有胸痛、低血壓、攝護腺癌或肝臟疾病，請告訴醫師；使用持續釋放劑型前，注意本身是否有便秘、短腸症、腸道狹窄或封鎖的病症。
- 4、於開刀前(包括牙齒)告訴醫師您在使用此藥。
- 5、當您第一次使用此藥或增加藥量，還是已停藥數日重新接受療程時必須瞭解的情況：橫臥突然爬起會有頭暈、頭昏、或昏倒的狀況。避免發生危險，您應慢慢下床，於床邊休息一會再緩緩站起。症狀沒改善請告訴醫師。
- 6、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 7、遵守醫師告訴您的飲食指示，包括低鈉、低鹽的飲食習慣。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；疲倦；四肢部份腫脹；呼吸不足；體重上升；肌肉關節疼痛或無力；視覺異常；流鼻水；性能力減低。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
心跳快速、猛烈、不規則；胸痛；呼吸不足；蕁麻疹；持續勃起，疼痛數小時。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：睏倦、頭暈、頭昏、昏倒、發作。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)