

Comtan 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Comtan 諾康停 膜衣錠	Entacapone	200 mg/fct

【作用】

治療帕金森氏症。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、與 levodopa 和 carbidopa 合並使用，一日最多八次。

【注意事項】

- 1、此藥能控制您的病情，但無法治癒，當您感覺情況改善時請勿私自停藥，突然停止用藥可能會使您的病情更加惡化。
- 2、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、開刀前(包括牙齒)請告訴醫師您在服用此藥。
- 4、若您曾患有肝臟方面的疾病或酒精中毒，請告訴醫師。
- 5、此藥可能會使你疲倦，操作具危險性機械包括開車應小心。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈、腹瀉、反胃、無法控制行動、胃痛、困倦、 尿液變色。	如果這些症狀嚴重或一直 持續，請告訴醫師
呼吸困難、幻覺、高燒、混亂、肌肉僵硬、虛弱。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)