

Ergometrine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ergometrine 意如宮錠	Ergometrine	0.2 mg/tab

【作用】

分娩時的子宮弛緩性出血、流產後出血、產褥期出血、子宮內膜刮除後的出血、子宮收縮不全。真正的作用機轉並不清楚，可能刺激 5HT（血清素）和 α 接受體而使血管及子宮收縮。

【用法和用量】

通常成人一天 1~3 次，每次 1 粒。

【注意事項】

- 1、本品為麥角生物鹼，有蓄積作用，請遵照醫師處方服用。
- 2、孕婦、胎兒頭部娩出之前、曾對麥角類製劑有過敏者禁用。
- 3、曾患有高血壓、妊娠中毒症、敗血症、肝腎、心血管疾病，請告訴醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉；血壓上升、頻脈、徐脈；頭痛、頭部後方麻木感、睏倦、眩暈、口乾、耳鳴、發熱、皮膚冷感；留滯胎盤、肌肉痛、壞疽	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
搔癢、蕁麻疹、皮疹、水泡、呼吸、吞嚥困難、喉嚨嘶啞、臉、喉嚨、嘴唇、舌頭、眼睛、手、腳、腳踝、下腿腫脹	請停藥，並立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

錯過服藥時間，應在想起後儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服，並在正常時間服用下一劑。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)

