

Ergoton 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ergoton 克痛 膜衣錠	Ergotamine Tartrate + Caffeine	1mg/100mg

【作用】

血管性頭痛，如偏頭痛、組織胺性頭痛。

【用法和用量】

頭痛發作時立即服用，每 30 分鐘服用 1 錠，一日最多不可超過 6 顆，一週最多不可超過 10 顆。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是抗黴菌藥 (itraconazole、ketoconazole)、抗生素 (clarithromycin、erythromycin)、抗病毒藥 (indinavir、nelfinavir)，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
2. 您計畫懷孕或可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。
3. 服藥期間請勿吸煙以免加重偏頭痛症狀。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有下列情形：

症 狀	如何處理
心悸、失眠、眩暈、皮膚過敏反應等	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
四肢末端刺痛感	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)