

Erythromycin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Erythrocin 紅力素	Erythromycin	250 mg/cap

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。
- 2、每日使用 3 至 4 次持續約 7 到 21 天，與充足水份服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀（包括牙齒），應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列藥物者應主動告知醫師：抗生素、抗凝血劑、astemizole、carbamazepine、cisapride、clozapine、cyclosporine、digoxin、disopyramide、ergotamine、felodipine、lovastatin、phenytoin、pimozide、terfenadine、theophylline、triazolam、維生素。
- 3、若您曾患有肝臟或胃方面的疾病、結腸炎，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；腹瀉；嘔吐；胃痙攣；輕微的皮疹；胃痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重的皮疹；發癢；蕁麻疹；呼吸或吞嚥困難；喘息；皮膚或眼睛泛黃；黑尿；淺色的糞便；異常的疲倦；陰道感染。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)