

Vytorin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Vytorin 維妥力錠	Ezetimibe + Simvastatin	10/20 mg

【作用】

降血脂。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日一次，於晚間隨餐或空腹服用。

【注意事項】

- 1、感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥或增減藥量。
- 2、若您懷孕或有其打算，請立即通知醫師；用藥期間亦不可哺乳，此藥可能會對胎兒造成傷害。
- 3、服用本藥前，如有開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、患者如果有肝臟、腎臟方面的疾病，或是平時有喝酒的習慣，請告知醫師。
- 5、服用此藥時請攝取大量的水份。
- 6、您的醫生可能會交代低脂肪、低膽固醇的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。
- 7、應避免飲用葡萄柚汁(含有抑制 CYP 3A4 的成份)。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
便秘。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
肌肉疼痛、敏感或無力；缺乏體力；發燒；皮膚或眼睛泛黃；胃的右上部疼痛；噁心；異常疲倦；異常的出血或瘀血；沒有胃口；症狀像感冒；紅疹；蕁麻疹；發癢；呼吸或吞嚥困難；身體局部腫脹；嘶啞。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。