

Fadin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Fadine 胃樂順膜衣錠	Famotidine	20 mg/tab

【作用】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎(胃酸倒流,引起心頭灼熱、食道受傷)、Zollinger—Ellison 症候群(如:胰臟瘤或小腸瘤造成胃酸分泌過多)、吻合術後潰瘍及上消化道出血(消化性潰瘍、急性緊張性潰瘍、出血性胃炎而引起的)

【用法和用量】

通常成人每次 20 mg, 1 日 2 次(早餐後及晚餐後或睡覺前)經口投與。
但上消化道出血時,通常以注射劑開始治療,待能口服後,始改成口服

【注意事項】

- 1、如果您對該藥過敏,請告訴醫師或藥師。
- 2、如果您曾經吞嚥困難或腎疾病,請告訴醫師。
- 3、打算懷孕、已懷孕、哺乳,應告訴醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生,但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭痛、眩暈、便秘、腹瀉、fussiness (大驚小怪,小孩服用後)	如果這些症狀嚴重或一直持續,請告訴醫師
蕁麻疹、皮疹、搔癢、喉嚨嘶啞、臉、喉嚨、嘴唇、舌頭、眼睛、手、腳、腳踝、下腿腫脹、呼吸或吞嚥困難	請停藥,並立即就醫

【忘了服藥怎麼辦?】

當您想起時,儘快補服,如果接近下次服藥時間,跳過一次,不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內,放在室溫、乾燥處(不要放在浴室),不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題,請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線:

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)