

## Febuton 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Febuton 達理痛 膜衣錠	Febuxostat	80mg/F.C. Tablets

### 【作用】

治療慢性痛風的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者

### 【用法和用量】

1、每日一次，一次半粒至一粒。空腹或飯後使用均可。

### 【注意事項】

1. 服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師。
2. 若您曾胸痛、器官移植、癌症、中風、Lesch-Nyhan 癥候群（是一種遺傳性疾病，導致血液中的尿酸濃度高，關節疼痛，伴隨運動與行為的問題）、或有心臟、腎臟、肝臟疾病，請告訴醫師。
3. 如果你正在服用 azathioprine (Imuran)、mercaptopurine (Purinethol) 或 theophylline，請告訴醫師，醫師可能叫你停用本藥。
4. 告訴您的醫生和藥劑師你正在服用或計劃服用其他處方藥和非處方藥，維生素、營養補充劑和草藥，特別是癌症化療藥，你的醫生可能需要改變你的藥物的劑量或仔細監視你的副作用。
5. 為確保此藥可以幫助您的病情，您定期看診，時常驗血。
6. 每日至少喝八杯以上的水或其他液體，除非您的醫師有別的指示。

### 【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、關節疼痛	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮疹、胸痛、氣促、言語慢或困難、頭暈或昏厥、手臂或腿部無力或麻木	請立即就醫

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)