

Diflucan 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Diflucan 泰復肯 膠囊	Fluconazole	50 mg/cap

【作用】

抗黴菌劑。

【用法和用量】

- 1、醫師可能會要求於療程的第一劑時服用雙倍劑量，請遵照醫師指示服用。
- 2、每日使用一次。

【注意事項】

- 1、如果覺得病情好轉請持續用藥，勿私自停藥或增減藥量，突然停藥可能會使感染在短時間內再次發生。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如有對藥物過敏或服用以下其他藥物，應主動告知醫師：
利尿藥；紅黴素；口服避孕藥；糖尿病用藥；amiodarone；anticoagulants；astemizole；benzodiazepines；cyclosporine；disopyramide；dofetilide；isoniazid；moxifloxacin；phenytoin；pimozide；procainamide；quinidine；rifabutin；rifampin；sotalolol；sparfloxacin；tacrolimus；terfenadine；theophylline；thioridazine；valproic acid；zidovudine。
- 4、若您曾患有癌症、AIDS、心律不整、心臟、腎臟或肝臟方面疾病，或是您有喝酒的習慣，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；頭暈；腹瀉；胃痛；胸口灼熱；味覺改變。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
反胃；異常疲倦；異常出血或瘀血；缺乏體力；胃口損失；胃的右上部位感到痛苦；皮膚或眼睛泛黃；症狀像感冒一樣；黑尿；淺色糞便；抽搐；紅疹；蕁麻疹；發癢；身體局部腫脹；呼吸或吞嚥困難。	請立即就醫

註：藥物過量之副作法：幻聽；極度害怕有人設法要謀害你。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)