

Avamys Nasal Spray 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Avamys Nasal Spray 艾敏釋 鼻用噴液懸浮劑	Fluticasone furoate	27.5 mcg/50ul/dose	白色塑膠瓶、藍色蓋子

【作用】

此藥是內固醇，用來治療長期及季節性的過敏性鼻炎，和長期的非過敏性鼻炎，症狀包括：鼻塞、打噴嚏、流鼻水、鼻子發癢。

【用法和用量】

本藥須由醫師處方使用。

- 1、老人、成人及12歲以上兒童：一天一次，每一鼻孔噴兩下。有時候一天需要兩次，每一鼻孔噴兩下。最大劑量不得超過每一鼻孔四下。
- 2、12歲以下兒童：一天一次，每一鼻孔噴一下。有時候需要一天兩次，每一鼻孔噴兩下。最大劑量不得超過每一鼻孔兩下。

- (1) 將鼻子擤乾淨，搖晃瓶身，移除綠色保護蓋。
- (2) 持住瓶子。
- (3) 將瓶嘴插入鼻孔，並依醫師指示之劑量次數壓放。依同方式用鼻噴霧劑對另一鼻孔給藥。
- (4) 蓋回藍色保護蓋，使用鼻噴劑時不要超過醫師指示之劑量次數。

【注意事項】

- 1 如有懷孕或準備懷孕、哺乳、開刀（包括牙齒）、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您有在服用處方藥（特別是類固醇）或成藥，維他命、營養補給品或中草藥請告訴醫師。
- 3、曾患有肺結核、白內障、青光眼方面的疾病或感染皰疹或您現在鼻子痛，請告訴醫師。
- 4、如果您最近有在鼻子上動過手術或鼻子有受傷，請告訴醫師。
- 5、曾患有水痘或麻疹並未接種過牛痘，請告知醫師。遠離這些傳染病的患者避免被感染，如發現身上有這些感染症狀，請立即通知醫師。

【不良反應】

症狀	如何處理
頭痛、鼻出血、鼻子灼熱或發炎、流鼻水、鼻黏液有血、咳嗽、胃消化不良、嘔吐、胃痛、腹瀉、頭昏眼花。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
喉嚨或鼻子疼痛並出現白色斑點、感冒樣症狀、喉嚨劇烈疼痛、視覺方面的問題、鼻子受傷、粉刺出現或增加、容易淤傷青腫、極度疲倦、肌肉軟弱、月經不規則、蕁麻疹、皮疹、發疹、皮膚搔癢、臉、喉嚨、舌頭、嘴唇、眼睛、雙手、雙腳、腳踝或下肢腫脹、聲音嘶啞、聲啞、呼吸或吞嚥困難、哮鳴、喘鳴。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

跳過一次，不要補服，依正常時間用藥。不要服用加倍劑量。

【藥品如何保存】

請置於室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)