

Lescol XL 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Lescol XL 益脂可長效緩釋錠	Fluvastatin	80 mg/fct	米黃色 圓扁形 錠劑 LESCOL XL / 80 標記

【作用】

血脂異常、降血脂。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥或增減用藥劑量。
- 2、本藥為持續釋放劑型，每日1次，睡前使用。
- 3、持續釋放劑型需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。

【注意事項】

- 1、若您懷孕或有其打算，請立即通知醫師；用藥期間亦不可哺乳，此藥可能會對胎兒造成傷害。
- 2、開始治療時醫師可能給低劑量，四週內會慢慢增量。
- 3、服用本藥前，如有開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、若您同時有在使用 cholestyramine (Questran)，請於使用此藥四小時後再服用 cholestyramine。
- 5、患者如果有肝臟方面的疾病，請告知醫師，醫師可能會建議您停用此藥。
- 6、若您有喝酒的習慣，且曾患有糖尿病、甲狀腺、腎臟或肝臟方面的疾病，請告訴醫師。
- 7、酒精會增加藥物副作用，請詢問您的醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 8、您的醫生可能會交代低脂肪、低膽固醇的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；胸口灼熱；難以入睡或持續睡眠；靜脈竇發疼；咳嗽。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
肌肉痛、敏感或無力；缺乏體力；發燒；皮膚或眼睛泛黃；胃的右上部疼痛；噁心；異常疲倦；異常的出血或瘀血；沒有胃口；症狀像感冒；紅疹；蕁麻疹；發癢；呼吸或吞嚥困難；身體局部腫脹；嘶啞；排尿痛苦；頻尿。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果已超過12小時，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)