

## Rasitol 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Rasitol 來喜妥 錠	Furosemide	40 mg/tab

### 【作用】

治療高血壓和各種情況（包括心臟或肝臟病）的液體滯留。可使腎臟將身體不必要的水和鹽清除到尿液中。

### 【用法和用量】

通常一天服用 1~2 次。當一天 1 次時，請早上服用，當一天 2 次時，請早上和傍晚服用。避免睡前服用。

### 【注意事項】

- 1、如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
- 2、本品只能控制高血壓，無法治癒，如果您感覺病情好轉，請勿擅自停藥。
- 3、如果在服用其他藥，包括：高血壓、毛地黃、消炎止痛、鋰鹽、糖尿病藥等，請告訴醫師。
- 4、如果您曾經罹患糖尿病、痛風、肝腎等疾病，請告訴醫師。
- 5、如果您打算開刀（包括牙齒）、懷孕、已懷孕、哺乳，請告訴醫師。
- 6、本品可能讓您對光敏感，沒必要時勿曝露於陽光下，應做好防曬，例如防護衣、太陽眼鏡或遮光劑等。
- 7、應遵循醫師指示，包括：日常運動、低鹽或低鈉鹽飲食、鉀的補充、增加富含鉀的食物（如：蕉、乾梅、葡萄乾和柑橘類果汁）。
- 8、應常規量血壓，偶爾做血液檢查。

### 【不良反應】

服藥後頻尿最少可能持續 6 小時，可能幾星期之後才會減少頻尿。

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
肌肉無力、眩暈、混亂、痙攣、口渴、反胃、嘔吐、頭痛、複視、便秘、不安	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
喉嚨痛、發燒、不尋常的出血或瘀血、嚴重的皮疹伴隨皮膚剝落、呼吸或吞嚥困難、耳鳴、聽力喪失、體重快速減輕。	請停藥，並立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。