

Lopid 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Lopid 洛脂 膠囊	Gemfibrozil	300 mg/cap

【作用】

降血脂。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日 2 次，早、晚餐前 30 分鐘服用，每日定時使用。

【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您同時有在使用 cerivastatin 請告知醫師。
- 4、若您曾患有膽囊、腎臟或肝臟方面的疾病，請告訴醫師。
- 5、您的醫生可能會交代低脂肪、低膽固醇的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃痛；胸口灼熱。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
肌肉痛、敏感或無力；視線模糊。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：胃痙攣；腹瀉；關節和肌肉疼痛；噁心；嘔吐。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)