

Plaquenil 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Plaquenil 必賴克瘦 膜衣錠	Hydroxychloroquine	200 mg/tab

【作用】

SLE、慢性風濕性關節炎、間日瘧、鐮狀瘧疾、日光疹。

【用法和用量】

- 1、用於預防瘧疾，一星期兩次於同一天服用。進入疫區前2星期開始服用，離開疫區仍持續治療達8週為止。治療成人時通常立即給予四錠的劑量，六至八小時後再給予兩錠，接著每兩天再持續給予兩錠的劑量。
- 2、治療紅斑狼瘡每日一至二次，每次服用一至二錠；用於治療類風濕性關節炎每日一次，每次服用一至三錠。
- 3、請遵照指示服用，若症狀無改善請與醫師聯絡，不可私自停藥增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：acetaminophen、digoxin、niacin、hydroxychloroquine、chloroquine、primaquine、iron-containing medications、isoniazid、methotrexate、rifampin、維生素、草本產品。
- 3、若您曾患有肝臟病、牛皮癬、紫質症、蠶豆症、皮膚炎、其它血液異常疾病或您有喝酒的習慣，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；頭暈；沒有胃口；反胃；腹瀉；胃痛；嘔吐； 皮疹。	如果這些症狀嚴重或 一直持續，請告訴醫師
閱讀障礙；光敏感；難以辨識距離；看見輕微的閃 光或光線；聽覺障礙；耳鳴；肌肉無力；皮膚流血 或瘀血；頭髮變白或掉落；心情或精神改變；心律 不整；睏倦；抽搐。	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)