

Ibuprofen 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Purfen 普服芬 膜衣錠	Ibuprofen	400 mg/fct
Sconin 速熱寧 口服懸液	Ibuprofen	20mg/ml, 60cc/bot

【作用】

慢性風濕關節炎、關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、背腰痛、手術及外傷後之消炎、鎮痛。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、錠劑：每次 1 粒，4~6 小時服用一次。
懸液劑：每次 0.25 ~ 0.5 ml/kg，每六至八小時一次
- 3、定時使用，可與食物併服，避免反胃。

【注意事項】

- 1、如果您有服用其他藥物或對藥物過敏，請告知醫師。
- 2、非醫師同意，否則請勿搭配其他止痛藥使用。
- 3、如果您曾氣喘、肝腎方面的疾病，應告訴醫師。
- 4、若您有懷孕或準備懷孕，請告訴醫師。
- 5、開刀前(包括牙齒)，應告訴醫師您在服用此藥。
- 6、小孩服用此藥後，若非服用大量的液體而嘔吐或腹瀉，請立即通知醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
便秘、腹瀉、脹氣或腹脹、頭暈、神經質、耳鳴。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
體重異常增加、發燒、水泡、發癢、蕁麻疹、身體局部腫脹、呼吸吞嚥困難、嘶啞、異常疲倦、胃的右上部位疼痛、反胃、沒有胃口、皮膚或眼睛泛黃、如同感冒一般、皮膚蒼白、心跳快速、血尿或尿液混濁變色、背痛、排尿困難或痛苦、視線模糊或辨色困難、眼睛紅痛、脖子僵硬、頭疼、困惑。	請立即就醫

註：用藥過量的副作用：頭暈；無法控制眼睛快速的運動；呼吸緩慢或短時期無法呼吸；嘴唇、嘴、和鼻子附近呈現藍色。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)