

## Coaprovel 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Coaprovel 可普諾維錠	Irbesartan /Hydrochlorothiazide	300/12.5 mg/ fct

### 【作用】

本態性高血壓及型 2 糖尿病引起的腎臟病和高血壓。有時也用來治療心衰竭。

### 【用法和用量】

1. 醫師會給較低的起始劑量，然後逐漸增加藥量，請遵照指示服用。
2. 每日使用一次。
3. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。

### 【注意事項】

- 1、懷孕或哺乳不可服用。用藥期間若懷孕應立即告訴醫師。
- 2、服用本藥前，如有服用其他藥物（利尿劑、nifedipine）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您曾患有心臟衰竭或腎臟疾病，請告訴醫師。
- 4、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
流鼻水；喉嚨疼痛；腹瀉；心口灼熱；異常疲倦。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部腫脹；嘶啞；呼吸或吞嚥困難；蕁麻疹；昏倒。	請立即就醫
藥物過量之副作用：頭昏；昏倒；心跳迅速、猛烈。	請立即送急診

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)