

Isoniazide 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Isoniazide 異菸鹼醯井錠	Isoniazide	100 mg/tab
Isoniazide (公費) 異菸鹼醯胙錠	Isoniazide	300mg/tab

【作用】

抗肺結核。

【用法和用量】

- 1、每日使用 1 次，於飯前 1 小時或飯後 2 小時服用，為了避免有反胃的感覺，可與一些食物或小點心併用。
- 2、請遵照醫師指示服用，不可私自停藥或增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
acetaminophen、antacids、carbamazepine、disulfiram、ketoconazole、phenytoin、theophylline、valproic acid、vitamins.
- 3、若您曾患有腎臟、肝臟方面的疾病、酒精中毒、糖尿病、週邊神經痛、HIV 或有使用注射性藥物的歷史記錄，請告訴醫生。
- 4、用藥期間請勿使用酒精飲料。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉；視覺問題。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
眼睛痛；手腳發麻或發疼；皮疹；發燒；腺體腫脹； 喉嚨疼痛；異常的出血或瘀血；胃痛；異常疲倦； 虛弱；缺乏體力；沒有胃口；反胃；嘔吐；黑尿； 皮膚或眼睛泛黃。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)