

## ISMO-20 用藥指導

### 【藥品資料】

| 商品名 / 中文名          | 主成份                      | 含量        |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| ISMO-20<br>愛舒脈錠    | Isosorbide-5-Mononitrate | 20 mg/tab |
| Imdur<br>寬心 持續性藥效錠 | Isosorbide-5-Mononitrate | 60 mg/tab |

### 【作用】

冠狀血管擴張。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每 6 小時服用一次。
- 3、請於空腹時與充足的水一起服用（飯前 1 小時或飯後 2 小時）。

### 【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、突然停藥可能會導致胸痛的症狀發生。
- 3、長期使用會產生耐藥性，藥物會失去其作用；若您經常性的喉嚨痛甚至越來越嚴重，請告訴醫師。
- 4、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 5、如果您曾患有貧血、青光眼，或最近頭部受傷過，請告訴醫生。
- 6、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 7、酒精會使藥物副作用更嚴重，請詢問醫師如何安全使用酒精性飲料。
- 8、當您頭痛時勿使用阿斯匹靈或其他止痛藥，請醫師幫您安排止痛的療程。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

| 症 狀                 | 如何處理                |
|---------------------|---------------------|
| 頭疼；紅疹；頭暈；反胃；頭疼；臉潮紅。 | 如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師 |
| 視覺模擬；嘴乾；胸痛；昏倒。      | 請立即就醫               |

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)