

Trandate 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Trandate 湍泰低	Labetalol	200 mg/tab

【作用】

降血壓

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 每日使用 2 至 3 次，請定時服藥。
3. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量，突然停藥可能會造成胸痛、心臟病發作。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 3、如果您曾患有哮喘或肺病、糖尿病、嚴重的過敏、嗜鉻細胞瘤、心臟、肝臟或腎臟疾病，請告訴醫生。
- 4、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 5、酒精會減少此藥的效用，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 6、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈、頭皮或皮膚疼痛、頭昏、異常疲倦、頭疼、反胃、鼻塞。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸或喘息不足、腿局部腫脹、體重異常上升、胸痛。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。