

Arheuma 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Arheuma 雅努麻	Leflunomide	20mg/tab

【作用】

用於治療成人類風濕性關節炎，並可能減緩類風濕病程對關節所造成之結構性損害。治療具活動性的成人乾癱性關節炎。

【用法和用量】

1. 治療由 100mg 起始劑量開始，一天一次，服用 3 天，維持劑量建議為 10mg 至 20mg，一天一次，服用本藥時應喝足夠量的白開水將藥錠整顆吞服，食物不會影響吸收。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 此藥與某些藥品會互相影響，若您有服用下列藥品，請主動告知您的醫師：
DMARDs (如 methotrexate)、抗凝血劑(例如：warfarin)、rifampin、cholestyramine 等。
2. 服用此藥期間請避免懷孕及哺乳。
3. 服用此藥需定期抽血檢驗血球數目是否正常，若您肝腎功能不佳、B/C 型肝炎帶原等疾病，請主動告知您的醫師，以進行更嚴密的監測，減少副作用的產生。
4. 服用此藥期間禁止施打活菌疫苗。
5. 服藥期間請避免長時間曝曬於陽光下，並做好防曬措施。

6. 【可能出現的副作用】

7. 服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
血壓上升、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛、體重減輕、頭痛、眩暈、虛弱感、落髮增加、濕疹、皮膚乾燥	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)