

Xyzal 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Xyzal 驅異樂	Levocetirizine	5 mg/fct

【作用】

是一種抗組織胺製劑，使用於緩解過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹等所引起的各種過敏徵狀包括：流鼻水、鼻塞、皮膚搔癢、眼睛紅癢等。

【用法和用量】

1. 通常一天一次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是其他抗過敏藥物、安眠藥、止痛劑、肌肉鬆弛、theophylline，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
2. 如果您有或曾經有腎及肝臟等疾病，應告知您的醫師。
3. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
4. 此藥可能會引起嗜睡，從事開車或具危險性的機械操作時，必須特別注意。
5. 如果您即將進行手術包括拔牙，請告訴您正在服用此藥。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃部不適、眩暈、昏睡等	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
心跳不規則或加快、排尿困難等	請立即就醫

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)