

Imolex 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Imolex 依莫瀉膠囊	Loperamide	2 mg/tab

【作用】

止瀉

【用法和用量】

請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您有發燒請告訴醫師。
- 3、使用兩日若還未產生效用或出現發燒、血便的症狀，請告訴醫師。
- 4、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 5、酒精會減少此藥的效用，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
嘴乾；頭暈；困倦；嘔吐；胃痛、難受、或腹脹；便秘；疲勞。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮疹；蕁麻疹；發癢；喘；呼吸困難。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)