

Finska 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Finska 柔他定錠	Loratadine	10mg/tab

【作用】

抗過敏、流鼻水、皮膚搔癢。

【用法和用量】

1. 每日服用 1 次。
2. 請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、開刀前（包括牙齒）應告訴醫師您在服用此藥。
- 3、若您有對藥物過敏或服用其他藥物，請主動告訴您的醫師。
- 4、如果您曾患有氣喘或肝、腎方面的疾病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；口乾；鼻出血；喉嚨疼痛；嘴痛；難以入眠或持續睡眠；神經質；虛弱；胃痛；腹瀉；眼睛紅癢。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；蕁麻疹；發癢；身體局部腫脹；嘶啞；呼吸或吞嚥困難；喘息。	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，需避光儲存，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)