

Minlife-P 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Minlife-P 特敏福持續性藥效錠	Loratadine/Pseudoephedrine	5mg/120mg

【作用】

緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

【用法和用量】

1. 成人及十二歲以上的小孩每天兩次，每次一錠。
2. 本品應整粒吞服，不可剝半及磨粉。

【注意事項】

1. 服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
2. 開刀前（包括牙齒）應告訴醫師您在服用此藥。
3. 若您有對藥物過敏或服用其他藥物，請主動告訴您的醫師。
4. 如果您曾患有氣喘或肝、腎方面的疾病，請告訴醫生。
5. 應小心使用於青光眼，消化性潰瘍狹窄，幽門十二指腸阻塞，前列腺肥大或膀胱頸阻塞、心臟血管疾病，眼內壓增高或糖尿病之病人。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有下列情形：
失眠、口乾、心跳過速等。

症 狀	如何處理
頭疼；口乾；鼻出血；喉嚨疼痛；嘴痛；難以入眠或持續睡眠；神經質；虛弱；胃痛；腹瀉；眼睛紅癢。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；蕁麻疹；發癢；身體局部腫脹；嘶啞；呼吸或吞嚥困難；喘息。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)