

Hyzaar 用藥指導

【藥品資料】

| 商品名 / 中文名 | 主成份 | 含量 | 藥品外觀 |
|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Hyzaar fct. 好悅您 膜衣錠 | Losartan HCTZ | 50 mg/粒 12.5 mg/粒 | 黃色 橢圓凸形 錠劑，717 |

【作用】

降血壓

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 每日使用一次。
3. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。

【注意事項】

- 1、 懷孕或哺不可服用此藥，用藥期間若懷孕或有其計劃者，應立即告訴醫師。
- 2、 服用本藥前，如有服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、 開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 4、 若您曾患有痛風、狼瘡、哮喘、過敏、心力衰竭、糖尿病、膽固醇或三酸甘油酯過高、肝臟或腎臟疾病，請告訴醫師。
- 5、 酒精會增強此藥副作用，請和醫師討論如何安全使用酒精飲料。
- 6、 腹瀉、嘔吐、喝水不足和冒汗過多，可能會導致血壓下降、頭昏和昏倒。
- 7、 您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

| 症 狀 | 如何處理 |
|--|---------------------|
| 頭暈；流鼻水；喉嚨疼痛；背痛。 | 如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師 |
| 身體局部腫脹；嘶啞；呼吸或吞嚥困難；蕁麻疹；嘴乾；口渴；虛弱；睏倦；心神不定；混亂；發作；肌肉痛或痙攣；排尿次數減少；反胃；嘔吐；頭昏昏倒；心跳迅速、猛烈、無規律。 | 請立即就醫 |

註：藥物過量之副作用：頭暈；頭昏；昏倒；心跳迅速、猛烈。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)