

Magnesium oxide 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Magnesium oxide 氧化鎂	MgO	250 mg/tab

【作用】

胃腸藥、軟便。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用一至四次。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您曾患有心臟、肝臟、腎臟或小腸方面的疾病，請告訴醫師。
- 3、若使用此藥做為緩瀉劑，需配服至少一個玻璃瓶的開水或果汁；勿空腹整天服用此藥。
- 4、使用其他用藥或不同種之氧化鎂製劑時，需至少有兩小時間隔。
- 5、此藥當制酸劑使用時勿超過兩星期；當瀉劑使用勿超過一星期，除非醫師指示您這麼服用。
- 6、您本身若有特殊的飲食習慣，如低糖或低鹽等，應告知醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
絞痛、腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹或蕁麻疹、發癢、頭暈或頭昏、心情或精神改變、異常疲倦、虛弱、反胃、嘔吐。	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)