

Semper 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Semper 仙派錠	Meclizine HCl	25 mg/tab

【作用】

預防暈車、頭暈、噁心、嘔吐。

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 動暈症(如暈車、暈船等)應於前一小時服用，必要時每 24 小時服用一次。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如果您曾患有青光眼、攝護腺肥大、尿道封鎖或哮喘，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
睏倦、疲勞、嘴乾。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
視覺模糊。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)