

Potarlion 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Potarlion 保痛樂膠囊	Mefenamic acid	250 mg/cap

【作用】

解熱、止痛（包括月經痛）、消炎（頭痛、牙痛、割傷後痛）

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，勿自行停藥或增減藥量。
- 2、每 6 小時服用一次。

【注意事項】

- 1、如果您有服用其他藥物或對藥物過敏，請告知醫師。
- 2、若您曾經患有胃出血、胃潰瘍、氣喘、經常流鼻水、鼻塞、長有鼻息肉，四肢部份腫脹或有肝腎方面的疾病，請告知您的醫師。
- 3、若您有懷孕或其準備，請告訴醫師。
- 4、開刀前(包括牙齒)，應告訴醫師您在服用此藥。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉、便秘、脹氣或腹脹、頭疼、頭暈、神經質、耳鳴。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
視線模糊、體重異常上升、發燒、水泡、紅疹、發癢、蕁麻疹、身體局部腫脹、呼吸或吞嚥困難、皮膚蒼白、心跳快速、異常出血或瘀血、缺乏體力、反胃、胃口不好、胃的右上部位疼痛、症狀像感冒一般、皮膚或眼睛泛黃、血尿或尿液混濁變色、背痛、排尿困難或痛苦。	請立即就醫

註：用藥過量的副作用：異常疲倦、反胃、嘔吐、胃痛、嘔吐物有血色或咖啡色的物質、糞便有血色或咖啡色、呼吸緩慢、昏迷(失去知覺)。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。