

Ebixa 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ebixa 憶必佳	Memantine HCl	10mg/fct

【作用】

中重度阿茲海症。

【用法和用量】

必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對本藥或其它藥品過敏。
2. 如果您有或曾經有疾病，應告知您的醫師。
3. 服藥後，請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
4. 服藥期間請勿吸煙。
5. 接受任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在服用本藥。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症 狀	如何處理
焦慮不安、失去信心、恐懼感、注意力不集中、呼吸困難、過度換氣、無食慾、腹瀉、噁心、肌肉僵硬、筋骨酸痛、排尿困難、行動困難	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
神經質、幻覺、頭暈、頭痛、視力模糊、呼吸短促、心跳不規則、體重異常改變	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)

