

Glucophage 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Glucophage 庫魯化 錠	Metformin	500 mg/tab

【作用】

降血糖（治療非胰島素依賴型糖尿病，型 2）

【用法和用量】

- 1、一日 1~3 次，飯後服用，極量：3 g/天。
- 2、複方藥品一天 1-2 次，不可咬碎，早餐飯後服用。
- 3、不可擅自停藥或增減劑量。

【注意事項】

- 1、可能引起罕見、致命的乳酸中毒，因此如果有心臟病、中風、高血壓、糖尿病酮酸症，請告訴您的醫師。
- 2、最近或已經有嚴重的感染、腹瀉、嘔吐、發燒或比平常少喝太多的水，請暫停服本藥。
- 3、一定要定期看診，並定期檢查血糖。
- 4、喝酒會增加乳酸中毒的危機或使血糖降低，若血糖太低，趕緊先吃含糖的食物（如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果）
- 6、若有肝、腎、心臟病、甲狀腺疾病或嚴重感染，請告訴醫生。
- 7、如準備開刀（包括牙齒）、注射顯影劑、已懷孕或想懷孕、哺乳、服用其他藥物，應告訴醫師。
- 8、如果您比平常吃得少或大量運動，這可能影響血糖，應告訴醫師。

註：低血糖症狀：顫抖、頭暈或頭昏、冒汗、神經質或激動、行為或情緒突然變化、頭疼、嘴周圍麻木或刺痛、皮膚蒼白、飢餓、笨拙或活動不平穩。若沒治療，會混亂、抽筋、喪失意識。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉、頭痛、胃不舒適、脹氣、便祕、鼻塞、疲倦、咳嗽、發燒、皮膚潮紅、眼睛發黃、不舒服金屬味道。	若有症狀，請告訴醫師。
胸痛、紅疹。	若出現症狀，應立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，室溫、避光、避熱、防潮，而且不容易被小孩拿到的地方，以免誤用此藥，產生不良反應。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。