

Betaloc ZOK 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Betaloc ZOK 舒壓寧 控釋錠	Metoprolol	100 mg/tab	白色 圓形 錠劑 AMS 橫刻線字樣

【作用】

單獨或合併其他藥品來治高血壓，也可預防狹心症和治療心臟病發作。也可合併其他藥品來治心臟衰竭。有時也用來預防偏頭痛和治療不規則心跳及精神病 (mental illness) 藥物引起的行動異常 (movement disorders)。

【用法和用量】

1. 醫師會給較低的起始劑量，然後逐漸增加藥量，請遵照指示服用。
2. 每日使用 1 次，用餐時一併服用或飯後服用。
3. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。突然停藥可能會造成胸痛、心臟病發作，醫師可能需要調配更大的劑量改善這些症狀。
4. 本品可整顆或剝半吞服，但不可咀嚼或敲碎。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物 (SSRIs、reserpine、抗心律不整藥) 或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 3、如果您曾經患有哮喘或其它肺病、心臟或肝臟疾病、糖尿病、或甲狀腺機能亢進，請告訴您的醫生。
- 4、本品可能會使您睏倦，避免操作危險機器，包括車子。酒精會增加此作用。
- 5、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。
- 6、本品會惡化其他藥物引起的過敏反應，且注射一般劑量的 epinephrine 可能無效。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
眩暈或頭昏、疲倦、憂鬱、反胃、口乾、胃痛、排氣或腹脹、心口灼熱、便秘、皮疹或搔癢、手腳發冷。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸短促、哮喘、四肢部份腫脹、體重異常上升、昏倒、心跳不規則，快速、猛烈。	請立即就醫
藥物過量之副作用：眩暈、昏倒、呼吸或吞嚥困難、四肢局部腫脹。	請立即送急診

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。