

Tolizole 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Tolizole " 國嘉" 德利治癒 膠囊	Metronidazole	250 mg/cap	長圓柱形綠色/黃色膠囊 一面有 KJ / 179 標示

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、每日使用 2 至 3 次，持續使用 5 至 10 天。
- 2、請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用以下其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
astemizole、disulfiram、lithium、phenobarbital、phenytoin、抗凝血劑、維生素。
- 3、若您曾患有血液、腎臟、肝臟方面的疾病或克隆氏病，請告訴醫生。
- 4、服藥期間不應該喝酒，酒精也許會導致以下之副作用：反胃、嘔吐、胃痙攣、頭疼、冒汗、臉潮紅。
- 5、應避免長時間曝曬於太陽下，平時應做好防曬措施：防護衣、太陽眼鏡、遮光劑等物品，此藥可能會使您的皮膚對光敏感。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
嘔吐；腹瀉；反胃；沒有胃口；口乾、令人不舒服的強烈金屬味；黑尿；長舌苔、嘴部或舌頭發炎疼痛；手或腳發麻、發痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；發癢；鼻塞；發燒；關節痛。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)