

## Mero 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Mero 敏羅黴素 膠囊	Minocycline	100 mg/cap

### 【作用】

抗菌劑。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日 2 至 4 次，飯前一小時或飯後兩小時與充足水份服用，不可和牛奶、鐵劑併服。
- 3、使用時請整顆吞服，不可咀嚼、剝半或敲碎。

### 【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您曾患有糖尿病或肝、腎方面的疾病，請告訴醫生。
- 3、用藥期間應避免日曬(包括太陽燈)，否則會使您的皮膚受傷，如果有傷口會使其更加惡化。做好保護措施：穿著保護的衣服、太陽眼鏡、遮光劑，勿使用陽傘；即使停藥一陣子內亦不可曝曬於陽光下。
- 4、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 5、會造成牙齒永久性變色，傷害骨頭造的鈣化。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
直腸或陰道發癢；腹瀉；頭暈或頭昏；皮膚或舌頭顏色變暗；皮膚赤紅；膚色產生變化；聽力喪失或耳鳴。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重頭疼；視線模糊；皮疹；蕁麻疹；呼吸或吞嚥困難；皮膚或眼睛泛黃；發癢；黑尿；沒有胃口；反胃；嘔吐；胃痛；異常疲倦或虛弱；混亂；關節僵硬或腫脹；異常的出血或瘀血；排尿減少；嘴部痛苦難受；喉嚨痛；發燒或冷顫。	請立即就醫

註：藥物過量副作用：頭暈；反胃；嘔吐。


### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)