

Loniten 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Loniten 洛寧	Minoxidil	10 mg/tab	白色 圓形 錠劑，一面刻 10 ， 另一面刻 U/137 字樣

【作用】

降血壓。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日使用 1 至 2 次。

【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、患者如果有心臟、腎臟方面的疾病、嗜鉻細胞瘤，請告知醫師。
- 4、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 5、酒精會增加藥物的副作用的效用，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 6、您的醫生可能會交代低鈉(少鹽)高鉀的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
體毛數量增生；頭暈；乳房觸痛；紅疹；頭疼；反胃；嘔吐。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
心跳快速；腳部腫脹；體重異常上升；困難呼吸；昏倒。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)