

NSAIDs 用藥指導

【藥品資料】

| 商品名 / 中文名 | 主成份 | 含量 |
|----------------------|----------------|------------|
| Volna-K 待可服寧 膜衣錠 | Diclofenac K | 25mg /fct |
| Frekey 飛佳 膜衣錠 | Aceclofenac | 100mg /fct |
| Arcoxia 萬克適 錠 | Etoricoxib | 60 mg/fct |
| Celebrex 希樂葆 膠囊 | Celecoxib | 200mg/cap |
| Potarlon 保痛樂膠囊 | Mefenamic Acid | 250mg/cap |
| Lacoxa SR 樂夠效 緩釋錠 | Etodolac | 400mg/cap |
| Purfen 普服芬 膜衣錠 | Ibuprofen | 400mg/tab |

【作用】

消炎、退燒、止痛

【用法和用量】

- 1、未經醫師指示切勿自行增加劑量。
- 2、請依各種不同藥品的指示服用。

【注意事項】

1. 長期服藥，可能發生心臟病或中風的危機。因此曾經高血壓、高膽固醇、糖尿病患者應告訴醫師。
2. 服藥後若發生胃痛、水腫，先停藥，回診。

腎功能不好的要小心。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

| 症 狀 | 如何處理 |
|---|-------------------|
| 腹瀉、便秘、脹氣、頭痛、眩暈、耳鳴 | 須告知醫師 |
| 無法解釋的體重增加、極度疲倦、沒有胃口、胃的右上方部位疼痛、眼睛或皮膚泛黃、感冒樣、發燒、水泡、紅疹等過敏、嘶啞、皮膚蒼白、尿液混濁、變色、帶血、背痛、排尿困難、心跳快速、呼吸或吞嚥困難 | 情況異常急迫應立即求救或送醫急救。 |

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)