

## Nifedipine 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Nifedipine S.R.F.C.T 恆脈循 持續性膜衣錠	Nifedipine	30 mg/tab
Atanaal 壓達能軟膠囊	Nifedipine	5 mg/cap

### 【作用】

降血壓、狹心症。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、持續釋放劑型：每日1次，飯前或飯後皆可。需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。
- 3、軟膠囊每日1~3次，飯前或飯後皆可。

### 【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、患者如果有心臟、腎或肝臟方面的疾病，請告知醫師。
- 4、不要與葡萄柚汁併服。
- 5、用藥期間不可飲用含酒精的飲品。
- 6、您的醫生可能會交代低鈉(少鹽)高鉀的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；反胃；頭暈或頭昏；異常疲倦；臉潮紅；胃灼熱；心跳快速；肌肉痙攣；便秘；鼻塞；咳嗽；性能力下降。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部腫脹；呼吸或吞嚥困難；昏倒；紅疹；皮膚或眼睛泛黃；增加心絞痛的頻率或嚴重性。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)