

Nitroderm TTS 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Nitroderm TTS 護心 貼片	Nitroglycerin	25mg/片

【作用】

預防和控制心絞痛，無法治癒。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示之部位使用。
- 2、一日使用一次。

【注意事項】

- 1、應避免使用於過敏、結痂、有傷口的皮膚，每日更換另一隻手以免發生過敏反應。更換時，確認已將舊貼片移除，方可貼上新貼片
- 2、此貼片無法根治心絞痛，縱使感覺已不再痛還是要繼續使用，在未告訴醫師前不能私自停用，突然停止使用可能會導致胸痛。
- 3、貼片掉落時應於同一部位貼上新貼片，舊貼片應將黏面對折並做適當處理，否則對兒童或是寵物還是會有害
- 4、長期使用可能會失去其效用，此為耐受性。心絞痛發生的頻率如果開始頻繁，甚至比之前更久更痛，請告訴醫師。
- 5、告訴醫生您對哪些藥物過敏，以及是否現在有服用其他藥物；如有罹患低血壓、青光眼或是頭部最近受傷，請一併告知。
- 6、使用此貼片前，如有懷孕或準備懷孕、哺乳，應告訴醫師。
- 7、若您正準備要開刀(包括牙齒)，請告知您的(牙)醫師您正在使用此貼片。
- 8、此貼片可能會使人昏眩、想睡，請勿駕駛交通工具或危險器具，除非你知道藥效何時會發作。
- 9、酒精可能會使副作用惡化，當您正在服用此藥時，請詢問您的醫師如何安全的飲用酒精飲料。

【不良反應】

症 狀	如何處理
頭疼、皮膚過敏或是起疹子、 頭暈、反胃、熱潮紅。	常見的副作用。如果這些症狀嚴重 或一直持續，請告訴醫師
視覺模糊、嘴乾燥、胸痛、昏倒。	請立即就醫

註：NTG 是需要適應的，如果頭疼到難以忍受可詢問醫師是否可服用普拿疼；
若非經過醫師許可，使用貼片時勿自行服用 Aspirin 或其他頭痛藥。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補用。不要使用加倍藥量。

【藥品如何保存】

貼片需放置於兒童拿不到的地方，置於乾燥、陰涼之處，不可放在冰箱或浴室。
過期或不再需要，請交給您的藥師處理。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)