

## Nystatin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Mycostatin 紐黴素	Nystatin	50 萬 U/tab
Mycostatin 懸浮用粉滅菌靈	Nystatin	10 萬 U/mL

### 【作用】

治療黴菌感染、治療鵝口瘡。

### 【用法和用量】

- 1、每日使用 2 至 3 次。
- 2、請遵照醫師指示服用。
- 3、Mycostatin 懸浮用粉配製時請加 23 cc 的水，搖均勻後即可使用。  
室溫可保存 7 天，每次 1 cc，含於口內數分鐘再 1 小時內避免吃、喝食物。

### 【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用其他藥物，應主動告知醫師。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
發癢；發炎；發燙。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
腹瀉；腸胃不適；胃痛；皮疹。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

Mycostatin 懸浮用粉配製後室溫可保存 7 天。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)