

## Olmetec 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Olmetec 雅脈	Olmесartan	20 mg/fct

### 【作用】

降血壓

### 【用法和用量】

1. 醫師會給較低的起始劑量，然後逐漸增加藥量，請遵照指示服用。
2. 每日使用一次。
3. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。

### 【注意事項】

- 1、懷孕或哺不可服用此藥，用藥期間若懷孕或有其計劃者，應立即告訴醫師。
- 2、服用本藥前，如有服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如果您曾患有心臟或腎臟疾病、神經血管水腫導致吞下或呼嚥困難、身體局部腫脹的情況，請告訴您的醫生。
- 4、此藥可能會使血壓過低，特別是第一次用藥。醫師可能會要求您於疹間服用，以方便觀察您對療程的反應。
- 5、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
暈眩。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部腫脹；嘶啞；吞嚥或呼吸困難。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：昏倒；頭暈；視線模糊；反胃；心跳快速或緩慢。


### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)