

Trileptal 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Trileptal 除癲達膜衣錠	Oxcarbazepine	300 mg/fct

【作用】

成人局部癲癇發作之單一或輔助治療，大於一個月孩童癲癇局部發作之輔助治療。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。不要以為病情好轉即擅自更改劑量或停服。
- 2、通常一天服用2次，可與食物併服。

【注意事項】

- 1、若對此藥過敏請告訴醫師、藥師或其他醫護人員。
- 2、如果同時服用其他藥物，如：高血壓、抗痙攣、口服避孕藥、抗心律不整、抗憂鬱劑、氫離子阻斷劑和利尿劑等，請告訴醫生，必要時改變用量或監測副作用。
- 3、如有懷孕或準備懷孕、哺乳、血液病、青光眼、高血壓、心臟病、肝腎疾病應告訴醫師。
- 4、本品可能讓您頭昏、眩暈、視力模糊、因此避免從事具潛在危險的活動，包括開車、操作危險機械。
- 5、酒精類飲料會加重頭昏，請小心飲用。
- 6、可能降低懷孕效果，請採用其他方式避孕。
- 7、當發作時間延長或發作次數比以前增加，請告訴醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭昏、疲勞、腸胃不適（噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃痛）、視力模糊、動作不協調、肌肉無力或突然僵硬、注意無法集中、紅腫、熱痛、刺激、灼熱、陰道搔癢	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
發燒合併嚴重皮膚反應、低血鈉、血管水腫、心律不整、白血球或血小板減少、紅斑性狼瘡、感染症狀、皮膚或眼睛泛黃、不正常出血或瘀血。	立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服。若接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服，在下次正常服藥時間吃藥即可。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍，置於兒童無法取得之處。當藥物過期或不再需要時，交給您的藥師做適當的處理。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。