

Strocain 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Strocain 息痛佳音錠	Oxethazaine POlymigel	5 mg 244 mg

【作用】

急性、慢性胃炎、所引起的胃痛、噁心、胃灼熱、以及胃部不快感。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用三至四次，應整顆服用，注意不要咬碎或是咀嚼，以避免殘留口中而產生麻木感。

【注意事項】

1. 如果您有腎臟疾病、心臟疾病、肝硬化或水腫，在服藥前應先告知醫師。
2. 請勿在沒有醫師的指導下服藥超過 2 週，症狀沒有改善或惡化時應告知醫師。
3. 原則上，服藥前後 1~2 小時儘量勿服其他藥物，但經醫師指示時，不在此限。
4. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應就醫確定診斷後再行服藥。如有闌尾炎或腸道發炎的症狀（嚴重腹痛、血便等）不得服用，應立即就醫。
5. 消化道潰瘍者應先就醫，不可自行服藥。
6. 本品會抑制四環類抗生素、毛地黃、鐵劑及類固醇的吸收，故避免併服。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有下列情形：食慾不振、口渴、噁心、便秘、頭痛、思睡，偶有發疹現象。

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)