

Aluzaine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Aluzaine 雅露佳 懸浮液	Oxethazaine Al(OH) ₃ Mg(OH) ₂	2 mg 61.2 mg 19.5 mg

【作用】

急、慢性胃炎所引起的胃痛、噁心、胃灼熱以及胃部不快感。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用三至四次。

【注意事項】

1. 使用前請搖勻，使用後蓋緊瓶蓋，服藥後請勿立即喝開水，以免減低藥效。
2. 服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
3. 若您曾患有心臟、肝臟、腎臟或小腸方面的疾病，請告訴醫師。
4. 請勿與四環素抗生素及鐵鹽併服。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有下列情形：

厭食，口乾，便秘，腹瀉，缺磷，頭痛，嗜睡，頭暈，四肢無力等情形。

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)