

PPI 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Okwe 歐克胃 腸溶微粒 膠囊	Omeprazole	40 mg/cap
Pariet 百抑潰 錠	Rabeprazole	20 mg/ect

【作用】

質子泵抑製劑 (PPIs) 是一類非常有效和普遍安全的藥物，用於治療心灼熱感、胃食道逆流 (GERD)、和消化道潰瘍。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用一次。勿磨成粉劑。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、藥物可能造成一些輕微的副作用，如頭痛和腹瀉。
- 3、由於減少胃酸，可能會增加某些感染，尤其在使用第一個月，會增加社區性肺炎的風險。Clos tridium difficile 的感染風險也會增加，它可導致腹瀉和高燒。
- 4、一些研究發現每天服 PPI 至少一年，有較高的骨折風險。
- 5、如果你有哮喘、肺疾病、免疫力下降或 65 歲以上，可能有感染的風險，建議每年接種肺炎和流感疫苗。
- 6、如果使用其他處方或非處方藥、維生素、營養補充劑、草藥，尤其：clopidogrel、warfarin、digoxin、benzodiazepines、ketoconazole、鐵劑、diuretics、antibiotics、phenytoin、theophyllin、atazanavir (Reyataz) and nelfinavir，應告知醫師，以調整劑量或監測不良反應。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
便秘、脹氣、噁心、嘔吐、頭痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮膚起泡或脫皮、紅疹或蕁麻疹、頭暈、水樣腹瀉、肌肉痙攣、異常疲勞、胃痛、發燒、身體不自主抖動、呼吸或吞嚥困難、腫脹的眼睛，臉，嘴唇，嘴，舌頭，或咽喉。聲音嘶啞。心跳不規則、快、或砰砰跳。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)