

Trenfylline 用藥指導

【藥品資料】

| 商品名 / 中文名 | 主成份 | 含量 |
|--------------------------|----------------|--------|
| Trenfylline 循血敏持續性膜衣錠 | Pentoxifylline | 400 mg |

【作用】

改善腦血流和腦代謝。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日服用3次，每次一粒。
- 3、本藥為持續釋放劑型，需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。

【注意事項】

- 1、使用二至四週可明顯感覺到效用，八週後會達到最大療效；此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物(抗凝血劑、維它命)或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如果您曾患有腎臟方面的疾病，請告訴您的醫生。
- 4、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

| 症 狀 | 如何處理 |
|-----------------|---------------------|
| 反胃；嘔吐；脹氣；頭暈；頭疼。 | 如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師 |
| 胸痛；心跳快速。 | 請立即就醫 |

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)