

Uroprin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Uroprin 路必淨	Phenazopyridine	100 mg/sct

【作用】

尿道灼熱感。

【用法和用量】

- 1、每日使用 3 次，三餐飯後吃。
- 2、使用時需整粒與充足的水吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。
- 3、當痛苦和難受完全消失，您可以停止服用此藥，但請遵照醫師指示服用，不可自行增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式。
- 3、若您曾患有腎臟方面的疾病或 G-6-PD 缺乏症(俗稱蠶豆症)，請告訴醫生。
- 4、尿液可能呈橘黃色，服藥期間可能會弄髒衣服或隱形眼鏡，患者應避免於療程期間使用隱形眼鏡。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼；頭暈；反胃。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮膚或眼睛泛黃；發燒；混亂；皮膚顏色改變(藍色或藍紫色)；呼吸不足；皮疹；排尿次數突然驟減；臉或四肢局部腫脹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)