

DilanTin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
DilanTin Na 癲能停 膠囊	Phenytoin	100 mg/cap

【作用】

癲癇症、心律不整。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、一天服用 2~3 次。

【注意事項】

- 1、飯後立即服用，以減少對胃的刺激。勿與大劑量胃乳片一起服用。
- 2、與口服避孕藥併用，會降低避孕效果，亦會降低本藥控制癲癇的效果。
- 3、避免與酒精性飲料共同服用。
- 4、劑量過高時會造成複視、動作不協調、走路不穩、精神混亂、幻覺、說話不清楚等現象。
- 5、不可擅自停藥，停藥時亦須逐漸減少。但若有眼球轉動異常、發音障礙、出紅疹時，應請醫師診治。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
牙齦紅腫、發炎、出血、腸胃不適、嘔吐、便秘、胃痛、食慾喪失、體重減輕、吞嚥困難、嗜睡、精神混亂、視覺模糊、失眠、神經質、肌肉抽動、頭疼、增加頭髮成長。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
協調動作有困難、皮疹、容易受傷、微小紫色皮膚斑點、流鼻血、說話含糊不清、異常出血、皮膚或眼睛泛黃、黑暗色尿、腺體腫大、發燒、喉頭疼痛。	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不可冷藏或冷凍，避光。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)