

Meptin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Meptin 滅喘淨 微錠	Procaterol	25ug/tab
Meptin L. 滅喘淨 液	Procaterol	5ug/cc 60cc/bot

【作用】

用於解除氣喘發作及慢性支氣管炎之支氣管平滑肌痙攣，使呼吸道順暢。

【用法和用量】

1. 通常每日二次，於早晨及睡前服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 若您有心臟病、高血壓、甲狀腺機能亢進、癲癇、糖尿病，請告知您的醫師。
2. 喝茶、咖啡、可樂，及抽煙會影響茶鹼的作用，當使用習慣改變時，請告知您的醫師。
3. 若您對 Procaterol HCl 或其他藥物過敏，請告知您的醫師。
4. 服用此藥時，應該主動告知您的醫師所有您同時服用的其他藥品；特別是治療氣喘、感冒藥、降血壓藥（乙型交感神經阻斷劑）等。
5. 若痰變稠或呈黃色，應盡快告知醫師，以確定是否有感染。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症 狀	如何處理
如果您有手抖、心悸、興奮、失眠、噁心等，症狀嚴重且持續時	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)