

## Rytmonorm 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Rytmonorm 心利正 膜衣錠	Propafenone	150 mg/tab

### 【作用】

心律不整。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每八小時服用一次。

### 【注意事項】

- 1、感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥或增減藥量。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 4、兩年內若曾心臟病發作，或曾患有肝、腎方面的疾病、充血性心衰竭、慢性支氣管炎、哮喘或肺氣腫，請告訴您的醫師。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈；睏倦；嘴乾；頭疼；反胃；腹瀉；便秘；嘔吐；沒有胃口；口味改變；脹氣；視線模糊。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸困難；胸痛；心率不整；心跳增加或減少；昏倒；皮疹；無故發燒、發冷或喉嚨痛；異常的出血或瘀血。	請立即就醫


### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，4小時內儘快補服，如果已經超過4小時，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)