

Inderal 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Inderal 恩特來 錠	Propranolol	10 mg/tab

【作用】

降血壓、狹心症、心律不整、偏頭痛、親鉻細胞瘤

【用法和用量】

- 請遵照醫師的指示服用。
- 每日使用 1 至 4 次；若為持續釋放劑型，每日一次即可。
- 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。
- 持續釋放劑型需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。
- 使用濃縮液時請與水混合使用，也可用果汁、汽水或攪入果醬中一併服用。

【注意事項】

- 服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 如果您曾經患有哮喘、嚴重過敏或其它肺病，心臟、腎臟或肝臟疾病，糖尿病、或甲狀腺有問題，請告訴您的醫生。
- 服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 酒精會減少此藥的效用，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈或頭昏；難以入眠；異常疲倦；反胃；嘔吐；紅疹；腹瀉；便秘。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸困難；喉嚨疼痛；異常出血；腳或手腫脹；體重異常上升；胸痛；心跳緩慢、不規則。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

