

Polupi (PTU)用藥指導

【藥品資料】

| 商品名 / 中文名 | 主成份 | 含量 |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Polupi (PTU) "汎生"僕樂彼錠 | Propylthiouracil | 50 mg/tab |

【作用】

治甲狀腺機能亢奮。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日共3次，間隔約八小時。
- 3、此藥可能會引起反胃的感覺，請搭配食物一起服用。

【注意事項】

- 1、未經醫師指示前勿擅自停藥或增減藥量。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物(抗凝血劑、糖尿病用藥、digoxin、或維他命)或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如果您曾患有任一血液疾病，譬如白血球減少、血小板減少、發育不全的貧血症，或肝臟病(肝炎、黃疸)，請告訴您的醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

| 症 狀 | 如何處理 |
|--|---------------------|
| 皮疹；發癢；異常掉髮；反胃；嘔吐；味覺損失；不正常的感覺(刺痛、發熱、緊繃感)；腫脹；關節和肌肉痛；困倦；頭暈；白血球減少；血小板減少。 | 如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師 |
| 喉嚨疼痛；發燒；頭疼；發冷；異常的出血或瘀血；胃的右上部疼痛導致沒胃口；皮膚或眼睛泛黃；皮膚發疹。 | 請立即就醫 |


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)